

sita la planta, li sia administrat en duas ó tres vegadas, prctica que no'ns cansarm d'aconsellar donats sos bons resultats.

Pels que vulguin sembrar blat de moro ab guano, els hi acompanym, si es que no'n tinguin ja una de comprovada prcticament, la segent formula:

COMPOSICI PER SACA DE 70 KILOS

Superfosfat de calcs de $18\frac{1}{2}$	45 Kg.
Sulfat amoniach.	13 "
Clorur de potassa.. . . .	12 "
	<hr/>
	70 "

Abans de calsar el blat de moro, es b posar una mica de nitrat de sosa al peu de cada planta,  rah d'uns 35  40 Kg. per quartera.

Molt b resulta l'escapsar el blat de moro, demunt de la espiga,  ff de facilitar el creixement d'aquesta, pro s'ha de tenir en compte, al ferse tal operaci, que la fecundaci ja estigui feta, puig que aquesta s'efectua al despendrers del plomall de la planta, que es l'orgue mascle, el polvo fecundant que cau demunt del orgue femella, anomenat estigma  sigui-la cabelleira de l'espiga y's desenrotlla l'ovari. Com que dita operaci no's realisa fins que floreix el plomall, dit est que fins desprs de la florida no 's pot escapsar la planta.

Fora molt encoratjador que sapiguessim que hi ha socis que practican ensaig dirigits  sapiguer el millor modo de adobar diferents cultius y  adquirir llevors de mes rendiments y de novas varietats, com v fent la Cmara, que apesar del poch temps que existeix, t encarregadas provas  determinats socis