



**TRATAMIENTOS EN FRUTALES DE PEPITA (Manzano, Peral)**

**PARADA INVERNAL**

Hacia febrero-marzo, cuando las yemas o «borrons» empiezan a hincharse, tratar contra Piojo de San José y hongos invernales.

Contra PIOJO DE SAN JOSE

- Aceite blanco de invierno con Ethión ... 3 lits.
- Agua ... 100 »

o bien

- Oleparafene ... 1'5 lits.
- Agua ... 100 »

Contra HONGOS INVERNALES tratar con

- Oxiclورو de Cobre 50% 500 grs.
- Captan o Ziram ... 400 »
- Agua ... 100 lits.

Los tratamientos contra Piojo de San José y hongos se pueden efectuar juntos. La mezcla de los productos ha de prepararse inmediatamente antes de la aplicación.

**EN FLORACION**

Si aparece el GORGOJO de la flor, tratar con

- Lindane 25 % ... 150 grs.
- Agua ... 100 lits.

Sólo en el caso de plantación de perales contra «Picabrots».

**CAIDA DE PETALOS**

Contra MOTEADO tratar con

- Captan 50 % ... 300 grs.
- Agua ... 100 lits.

Este tratamiento debe repetirse siempre que haya peligro de infección. En tiempo húmedo se repetirá cada 8 días.

Puede emplearse igualmente Ziram, Dordine, Benlate, Euparene, etc.

Si existen señales de malura u oidio, añadir al tratamiento anterior Karathane o bien azufre mojable.

**A MEDIADOS DE MAYO**

Contra AGUSANADO o «CORC» tratar cada 12 ó 15 días con una de estas fórmulas:

- Carfene ... 200-250 grs.
- Agua ... 100 lits.
- Zolone ... 200 c. c.
- Agua ... 100 lits.
- Sevín 50 % ... 250 grs.
- Agua ... 100 lits.

No emplear el Sevín hasta que el fruto tenga el tamaño de una nuez.

**DURANTE LA VEGETACION**

Si aparece araña roja, tratar a los primeros síntomas con

- Metasystox ... 150 c. c.
- Tedion V-18 ... 150 c. c.
- Agua ... 100 lits.

Si sólo hay que combatir araña

- Evadex (Bayer) ... 80 grs.
- Agua ... 100 lits.
- Plictran ... 120 grs.
- Agua ... 100 lits.

Si aparece PULGON tratar con:

- Lannate, Metasystox, Rogor, etc. ... 150 grs.
- Agua ... 100 lits.

Nota: El tratamiento del MOTEADO se puede hacer junto con el del pulgón.

Si aparece ataque de MOSCA DE LAS FRUTAS, tratar un mes antes de la recolección con

- Lebaycid 50 % ... 200 c. c.
- Agua ... 100 lits.

Este tratamiento también sirve para el «CORC».

Contra la mosca, puede emplearse también Dipterex, Diazinol, Fitios, etc.

Diez días antes de la recolección de fruto, para darle color, tratar con:

- Captan 50 % ... 300 grs.
- Agua ... 100 lits.

Para realizar todos estos tratamientos existen diversos productos, todos eficaces y de diversas casas comerciales. La Agencia de Extensión Agraria está a su disposición para asesorarle y ayudarle a conseguir cada vez mejores resultados.

**JAIME REIG NURI**

Agencia Comarcal de Extensión Agraria de Granollers


**TEMPERATURES**

Del mes de febrer:

Día	Màxima	Mínima
1	12	5
2	13	5
3	12	3
4	9	1
5	12	7
6	15	5
7	13	4
8	11	1
9	12	3
10	14	3
11	13	2
12	12	5
13	12	6
14	12	3
15	14	5
16	11	4
17	12	3
18	12	6
19	9	5
20	10	7
21	11	2
22	13	4
23	13	4
24	10	0
25	10	-1
26	10	0
27	12	0
28	10	2

**PLUJA**

No hem rebut la relació d'aigua caiguda en el mes de febrer. Ho publicarem en la informació del número següent.



**Construcciones**

**Hnos. MOLINS**

Tels. 285, 286 y 524  
«La Tosca» - Calle de la Serra  
**SANTA EULALIA DE RONSANA**