



TEMPERATURES

Del mes de setembre:

Dia	Màxima	Mínima
1	25	15
2	25	17
3	23	15
4	22	15
5	25	15
6	25	18
7	26	15
8	26	16
9	26	19
10	25	18
11	24	17
12	24	16
13	27	17
14	26	16
15	26	18
16	25	18
17	20	15
18	20	15
19	21	15
20	22	16
21	20	14
22	21	14
23	22	15
24	20	15
25	20	10
26	21	13
27	21	16
28	20	12
29	15	7
30	16	8

Joan Cabot Barbany

PLUJA

Aigua caiguda a Sta. Eulàlia durant el mes de setembre:


Dies	litres m. ²
16	25'3
17	59'7
22	0'4
28	3'5

Total ... 88'9

Aigua caiguda a la conca del Besòs durant el setembre de 1972:

	litres m. ²
Sta. Eulàlia de Ronsana	149'2
Balenya	80'5
Caldes de Montbui	116'3
Cànoves	105'3
Cardedeu	100'3
Centelles	114'3
Granollers	106'1
Linàs del Vallès	116'5
Martorelles	91'7
Mollet del Vallès	126'5
Montmeló	88'7
Sabadell	70'9
Sta. Coloma Gramanet	170
Sta. M.ª Barbarà	75

J. Batlle



Herbicidas contra «cogula y margall»

En cereales la «cogula» y el «margall» son las dos malas hierbas que más problemas causan al agricultor, por su gran difusión y difícil eliminación.

Herbicidas existentes en el mercado

- 1.º Eficaces contra «cogula» y «margall»
DICURAN (Clorholuron)
DOSANEX (Metoxuron)
- 2.º Eficaces contra «Cogula» solamente
SUFFIX (Benzoil-propetil)
AVADEX (Triallato)
CARBYNE (Barban)

Características y momentos de aplicación

DICURAN. — Puede aplicarse desde la siembra hasta que el cultivo y la «cogula» tienen 2-3 hojas, recomendándose la primera época de aplicación.

Controla también la mayoría de las restantes malas hierbas del cereal, excepto cardos y algunas otras.

Puede aplicarse en los siguientes cultivos y variedades:

Trigo:

- Pané 247
- Estrella
- Capitoleo
- Splendeur
- Champlain
- Mara

Cebada:

- Hatíf de Grignon
- 6 Carreras País
- Ager

No puede aplicarse en trigos Montbuy ni en cebadas cerveceras tales como Wisa, Unión, etc., porque acusan fitotoxicidad.

Dosis: El «margall» puede controlarse con una dosis de 2'5 kg. Ha. Si existe «cogula» una dosis media es de 3'5 kg/Ha.

DOSANEX. — Eficaz contra «cogula» y especialmente contra «margall».

Su época de aplicación es a la salida de invierno.

Puede aplicarse tanto en trigo como cebada.

Dosis. — De 4 a 6 kg/Ha. Las dosis máximas pueden ocasionar toxicidades en algunos casos.

SUFFIX. — Producto muy eficaz contra «cogula». Su momento de aplicación oscila desde el comienzo del encañado hasta la formación del segundo nudo.

No se puede utilizar mezclado con otros herbicidas.

Solamente puede aplicarse en trigos tales como:

- Pané 147
- Estrella

- Capitole
- Splendur
- Champlain
- Mara

La cebada no resiste el producto.
Dosis. — De 5 a 8 litros/Ha.

AVADEX BW Granulado. — Eficaz contra «cogula».

Su momento de aplicación oscila entre la emisión de la primera y tercera hoja de la «cogula».

Puede emplearse tanto en trigo como cebadas.

Dosis. — De 12 a 20 kg/Ha., recomendándose para el trigo una dosis máxima de 16 kg/Ha.

Existe también AVADEX emulsión siendo su momento de aplicación el inmediato a la siembra, teniendo que enterrarse con grada o apero similar.

CARBYNE. — Eficaz contra «cogula» pero muy exigente en humedad y temperatura, así como en uniformidad del terreno. En caso contrario puede provocar daños en el trigo.

Se puede aplicar en trigos y cebada siendo más eficaz sobre este último.

Dosis. — De 2 a 2'5 litros por Ha.

NORMAS PRACTICAS DE APLICACION DE ESOS PRODUCTOS

A la hora de aplicar cualquier de los productos indicados se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

— Deben aplicarse en pulverización.

— El consumo mínimo de agua por Ha., será de unos 400 litros.

— La presión de la máquina pulverizadora debe ser de 4 a 5 atmósferas, lo que permite una distribución uniforme y un gasto de agua adecuado.

— Excepto en las aplicaciones de AVADEX Emulsión, es conveniente que el terreno haya recibido un pase de rulo antes de la aplicación del herbicida. Y es del todo imprescindible si se aplica DICURAN inmediatamente después de la siembra.

— Debe procurarse que el grado de humedad del terreno sea elevado en el momento de la aplicación y en un mes después de la misma.

El control de estas malas hierbas específicas de los cereales deja de ser un problema aplicando el herbicida adecuado a su terreno en el momento oportuno.

La Agencia de Extensión Agraria, está siempre a su disposición para asesorarle y ayudarle a conseguir buenos resultados.

JAIME REIG NURI
Agencia Comarcal del Servicio de
Extensión Agraria de GRANOLLERS