



MANEJO DE CONEJOS

La cría de conejos debe hacerse en un lugar dedicado exclusivamente a ello, pues de esta forma podemos comprobar la alimentación y disminuir el riesgo de enfermedades, así como, diversos problemas propios de los mismos.

Para que el manejo sea eficiente hay que tener en cuenta:

- 1 — Alojamiento
- 2 — Reproducción
- 3 — Animales
- 4 — Alimentación
- 5 — Fichas de control.

1. Alojamiento

Las jaulas pueden estar instaladas al aire libre, con la protección de un tejadillo de uralita para protegerles de las inclemencias del tiempo, en un sitio resguardado de los vientos dominantes de la comarca, o bien habilitando locales donde haya buena ventilación, puedan limpiarse con facilidad y sean secos pues el conejo es muy sensible a la humedad.

Jaulas. — Pueden ser metálicas o de madera.

Las metálicas son más aconsejables por su limpieza fácil y su mayor duración. El piso de las jaulas será de malla electrosoldada lo suficiente amplia para que puedan caer los excrementos directamente al suelo y no estar en contacto con los conejos, para evitar enfermedades (Coccidiosis).

El tamaño de la jaula varía según la raza de conejo. Van de 0'50 m.² a 1 m.² en razas muy pesadas (tipo Mariposa).

Nidales. — Pueden ser fijos o acoplables a la jaula. Debemos proporcionar a la coneja una buena cama de paja de cebada que es fina y flexible. La cama es primordial para que los gazapos no se mueran de frío, principalmente en invierno.

Comederos y bebederos. — Tanto si son móviles como fijos estarán siempre limpios y con abundante agua y comida para que los animales nunca pasen hambre ni sed.

2. Reproducción

De 5-6 meses las conejas ya son para la reproducción; los machos de 6-8 meses. El número de partos por hembra y año serán de 6-7.

Por cada macho debe tener 10 conejas. El acoplamiento de los conejos se debe efectuar llevando la coneja a la jaula del macho nunca al revés pues es una pérdida de tiempo. Vigilaremos el momento del acoplamiento para una vez efectuado retirar a la coneja.

Las hembras deben cubrirse entre los días 17-21 después del parto, aunque también se puede adelantar o retrasar según el número de gazapos que tengan, el gra-

do de desarrollo de los mismos, etc.

3. Animales

En la elección de los animales tendremos en cuenta que sean sanos, fuertes y buenos reproductores. La raza a elegir será del país, o bien elegir un macho de raza (Neozelandés, California o Leonado de Borgoña) y una hembra del país. Las crías de estos animales cogerán las características de ambos; de la madre sacarán el sabor de la carne, la resistencia a las condiciones climatológicas y del padre el desarrollo (gazapos de 2-2½ con 3 kg. de peso).

4. Alimentación

Los conejos se alimentan de pienso compuesto equilibrado, forraje (alfalfa esparceta, nabos, remolacha, etc.) y agua. Si el forraje se les da todo el año es mucho mejor sino puede ser, seco o ensilado; que no esté húmedo, enmohecido o tratado con productos fitosanitarios, pues ocasiona trastornos digestivos (diarreas).

A los conejos de engorde se les puede dar pan duro, siempre que dispongamos de él.

5. Fichas de control

En el manejo de cualquier animal se lleva un control para saber sus antecedentes, tales como padres, partos, fecundidad, etc. que nos permitirá elegir los más apropiados para conservarlos como reproductores.

Siendo los conejos unos animales que se reproducen muy rápidamente, en comparación con otras especies, es necesario llevar un control, pues si nos fijamos sólo de nuestra memoria es fácil que nos traicione.

Cada jaula debe llevar un número y una ficha delante colgada, para que cuando vayamos a ver a los animales tengamos delante todo su historial.

Como más datos se tengan de los animales mejor, pero si es una explotación familiar y no se quieren muchas complicaciones, basta con los datos más rudimentarios que a la vez nos darán idea exacta de como está la explotación.

Estos datos pueden ser: día de cubrición, macho, día de parto, número gazapos —vivos o muertos— y número de gazapos destetados. Con ello siempre sabremos que animales son los más productivos, los que podemos guardar para reproductores o al contrario los que es necesario eliminar para carne.

Si desea más información acuda al Servicio de Extensión Agraria, le orientarán gustosamente.

DOLORS MEIX BOIRA

Agte. de Economía Doméstica de la Agencia Comarcal del Servicio de Extensión Agraria de GRANOLLERS



TEMPERATURES

Del mes de febrer:

Dia	Màxima	Mínima
1	6	0
2	7	1
3	10	1
4	13	2
5	11	10
6	14	9
7	14	9
8	12	8
9	11	8
10	10	4
11	12	6
12	10	2
13	12	5
14	10	1
15	9	-1
16	8	-1
17	8	-1
18	10	1
19	12	6
20	11	6
21	14	7
22	13	6
23	13	8
24	14	5
25	12	6
26	14	7
27	11	1
28	12	1
29	12	1

Del mes de març:

Dia	Màxima	Mínima
1	13	2
2	13	3
3	14	4
4	13	5
5	15	3
6	14	6
7	13	6
8	14	5
9	11	5
10	10	0
11	11	1
12	12	5
13	6	0
14	13	3
15	15	4
16	13	5
17	14	3
18	16	5
19	17	6
20	18	8
21	16	6
22	13	3
23	13	3
24	13	2
25	14	4
26	16	5
27	18	6
28	18	5
29	17	7
30	22	7
31	18	9

J. Cabot Barbany

PLUJA

Aigua caiguda a Sta. Eulàlia durant el mes de febrer de 1976:

Dies	litres m. ²
3	5
4	0'2
5	5'2
6	1'6
14	18
19	28

Total ... 58