



RESUMEN DE LAS NORMAS MAS ELEMENTALES A TENER EN CUENTA EN LA ALIMENTACION Y MANEJO DEL GANADO

- 1.º Se suministrará una ración forrajera equilibrada.
- 2.º Se suplementará la ración forrajera con un pienso compuesto equilibrado. Se aconseja que contenga 0'95 unidades alimenticias por kilo y 13'5 - 14'5 por 100 gramos de proteína digestible.
- 3.º Con este tipo de pienso, un kilo nos cubrirá 2'5 litros de leche.
- 4.º Por cada 2'5 litros de leche, que sobrepasen los 7-8 cubiertos por la ración de volumen, se suministrará un kilo de pienso.
- 5.º Se procurará suministrar medio kilo o un kilo de pienso, de lo que correspondería, comprobando si la vaca responde a esta sobrealimentación.
- 6.º Orden de suministro de los alimentos:

- 1.) Pienso
- 2.) Ordeñar
- 3.) Agua (preferible a voluntad)
- 4.) Alimentos secos (alfalfa y paja.
- 5.) Ensilado

7.º Utilización de minerales.

Es imprescindible suministrar minerales a las vacas y terneras, además de los que ya contiene el pienso.

La Agencia del Servicio de Extensión Agraria le indicará la fórmula más adecuada para cada caso. Solicítela.

Además se dispondrá de unos cajones, situados en los patios de ejercicio, que contendrán separadamente los siguientes minerales:

- Fosfato bicálcico
- Bicarbonato sódico
- Carbonato cálcico
- Sulfato magésico
- Sal común

8.º Momento de cubrir a las terneras, «braves».

Tienen que pesar de 380 a 400 kilos, sobre los 15 meses de edad, para que el parto tenga lugar sobre los dos años de vida del animal. Recomendamos utilizar la inseminación artificial.

9.º En los sucesivos partos hay que cubrir a la vaca entre los 2 y los 3 meses, para obtener un ternero cada año.

10.º Hay que ordeñar a la vaca durante (305 días) y darle un período de descanso, «eixugar la vaca», dos meses antes del parto.

A partir del tercer o cuarto mes de lactación, la vaca tiene que empezar, paulatinamente, a ganar peso. Tiene que recuperar el mismo peso que tenía al iniciar el parto anterior. Durante los dos últimos meses, se complementará la alimentación con el fin de ponerla en condiciones para la próxima lactación.

11.º Es muy conveniente que las vacas puedan salir durante todo el año a los patios de ejercicio, desde media mañana hasta media tarde. Es totalmente indispensable que, al menos durante los dos meses antes del parto, se coloquen en una estabulación libre.

12.º En la estabulación libre, donde estarán permanentemente las vacas «eixutes», dispondrán de los correspondientes minerales a discreción colocados en unos cajones, separadamente, tal como se ha indicado.

Es conveniente con el fin de prever la fiebre vitularia, «febres de la llet», suprimir el compuesto mineral 8 o 10 días antes del parto (durante estos últimos días de espera, pueden colocarse las vacas en un departamento separado).

JAIME REIG NURI

Jefe de la Agencia Comarcal del Servicio de Extensión Agraria de GRANOLLERS (Barcelona)



TEMPERATURES

Del mes de gener:

Dia	Màxima	Mínima
1	7	1
2	7	1
3	8	-1
4	10	1
5	10	1
6	12	5
7	16	8
8	14	8
9	14	8
10	13	4
11	16	5
12	14	4
13	12	3
14	13	5
15	13	5
16	15	5
17	13	5
18	10	3
19	12	2
20	11	1
21	11	2
22	9	1
23	9	-2
24	9	0
25	11	1
26	10	2
27	11	4
28	12	3
29	11	6
30	11	1
31	12	4

PLUJA

Aigua caiguda a Sta. Eulàlia durant el mes de gener:

Dies	litres m. ²
8	1'3
29	1'4
30	3'1
31	0'4
Total	6'2

J. Batlle

Construcciones

Hnos. Molins

Tels. 285, 286 y 524
«La Tosca» - Calle de la Serra
SANTA EULALIA DE RONSANA

