

Las empeltadas primerencas donan, generalment, més soldaduras que las fetas quan la vinya está ja en vegetació.

Els bons formiguers que calsan els empelts, la supressió dels rebrots dels peus, el despuntament del brot principal del aixart y la supressió de las arrels que aquet tregui, son cuydados necessaris pera la bona marxa dels ceps empeltats.

C. Els ceps anomenats *productors directes* poden constituir un recurs pera determinadas comarcas, hont per la contrarietat del clima y de la temperatura, ó per escassetat de personal apte, se fa anti-económich ó impossible 'l conreu de la vinya empeltada.

Fins en comarcas complertament vitícolas, l'adopció de determinats *productors directes* pot ésser convenient, ja pera obtenir vins de molta intensitat colorant y riquesa d' extracte sech, com pera obtenir tipos ó barrejas ab vins de vinyas empeltadas al mes *baix preu*.

4.^a A. Las terras fértils y frescals son las que poden donar majors beneficis dedicantlas á produir vins comuns, plantantlas de varietats de gran desenrotllo y aptas á ser conduidas ab podas llargas.

Las terras secas y poch fértils, propias pera donar vi de calitat, son las reservadas al cultiu de varietats escullidas, generalment poch productivas y que exigeixen podas curtas.

B. L'esporgar els ceps suprimint els rebrots (cavalls) y pámpols (espampolar), será tant y més perjudicial quant menys vigorosas siguin las varietats y quant més pateixin d'aixut las vinyas.

L'esporgar deurá quedar limitat á la supressió dels brots que surtin á la soca, y sols en els llochs molt ombrivols ó humits tindrà rahó de ser la supressió dels pámpols que privin de que s'airejin els rahims. Quan per efecte de humitats persistents hi hagi perill de que 'ls rahims no granin, ó sigui que's temi que hi hagi *blima*, podrán despuntarse las brancas de fruit (sobre-colls) y suprimir alguns rebrots (cavalls).

5.^a A. Si las trevalladas superficiales teóricament y per algunas experiencias semblan oferir ventatjas en els conreus anyals, á las treballadas fondas, abans de decidirse á establirlas en grans extensions, deurán ferse numerosos y repetits experiments.

B. Las einas (rasclas y esmejencadoras) mogudas per cavallerías poden fer aquestas feynas ab economia de temps y de diners, sobre tot en terras plenas ó lleugerament inclinadas.

6.^a La defensa contra las pedregadas sembra possible ab canonadas y explosió de *petarts* y cohets si las zonas son extensas, las organisacions ben fetas y están els canons en condicions de fer disparos ab cargas de 150 ó 200 grams de pólvora y las trompas dels canons tenen de 3 á 4 metres. Las estacions de tir han d'estar colocadas á una distancia máxima de 600 metres una d'altra.

Contra las geladas per l'ús dels núvols artificials per grans fumeradas poden evitarse els efectes del desgel que rosteix els brots dels ceps. Poden prevenirse també las geladas, en part, podant al comensament d'Octubre y untant las llevadas de la poda ab solucions de sulfat de ferro al 40 per 100.