

sita la planta, li sia administrat en duas ó tres vegadas, pràctica que no'ns cansarém d'aconsellar donats sos bons resultats.

Pels que vulguin sembrar blat de moro ab guano, els hi acompanyém, si es que no'n tinguin ja una de comprovada pràcticament, la següent formula:

COMPOSICIÓ PER SACA DE 70 KILOS

Superfosfat de calcs de $18\frac{1}{2}$	45 Kg.
Sulfat amoniach.	13 "
Clorur de potassa.. . . .	12 "
	<hr/>
	70 "

Abans de calsar el blat de moro, es bó posar una mica de nitrat de sosa al peu de cada planta, á rahó d'uns 35 ó 40 Kg. per quartera.

Molt bó resulta l'escapsar el blat de moro, demunt de la espiga, á ff de facilitar el creixement d'aquesta, pro s'ha de tenir en compte, al ferse tal operació, que la fecundació ja estigui feta, puig que aquesta s'efectua al despendrers del plomall de la planta, que es l'orgue mascle, el polvo fecundant que cau demunt del orgue femella, anomenat estigma ó sigui-la cabelleira de l'espiga y's desenrotlla l'ovari. Com que dita operació no's realisa fins que floreix el plomall, dit está que fins després de la florida no 's pot escapsar la planta.

Fora molt encoratjador que sapiguessim que hi ha socis que practican ensaig dirigits á sapiguer el millor modo de adobar diferents cultius y á adquirir llevors de mes rendiments y de novas varietats, com vé fent la Cámara, que apesar del poch temps que existeix, té encarregadas provas á determinats socis