

# Sección Agrícola y Ganadera

Podemos decir que hemos entrado de lleno en el verano, por el calor y por la intensidad de trabajo que tiene el agricultor. Se ha segado ya y se empiezan a arrancar las patatas y acto seguido se preparan las tierras para las cosechas tardías, sobre todo en regadío.

La cosecha de trigo se puede calificar de regular al igual que los otros cereales. Lo que pasa es que cada año se destina menos superficie para este cultivo. El trabajo de recolección es muy simplificado. La maquinaria, que ha venido a suplir la carestía de la mano de obra, se encarga de ello con eficiencia. Al agricultor sólo le queda el trabajo de ir a retirar los sacos de grano y las pacas de paja. ¡Ah, y de pagar!

La cosecha de las patatas ya no podemos calificarla igual. Será la presente bastante más baja que lo normal. Hay que añadir a esto el precio de este tubérculo que no favorece en nada para que el agricultor se vea estimulado a sembrar patatas. Los trabajos de recolección no son tan simples como los del trigo. Si bien es verdad que se han ensayado máquinas de arrancar patatas no son muchos los que se servirán de ellas.

Un cultivo nuevo se ha ensayado en nuestra población, éste es el del girasol. Hasta el momento presente parece que será un cultivo rentable. Poco coste de simiente y trabajos de siembra y cultivo. Precio garantizado a la hora de la venta. Resistente a la sequía y una producción por hectárea nada envidiable. Al menos así lo aseguran los promotores de dicho cultivo. Esto queda por ver pero por el aspecto que presentan las plantaciones parece va a ser así. Dichas plantaciones ofrecen una belleza inédita a nuestros campos.

En ganadería hemos vuelto atrás. Los lechones, cerdos y terneros han cedido en sus precios y el paulatino aumento que se preveía hace un mes ha quedado completamente anulado. Los pollos esta vez merecerían capítulo aparte. Su cotización es satisfactoria y bastante rentable. De todas maneras no podemos echar las campanas al vuelo ya que estamos acostumbrados a que sufran serios bajones y «El que es guanya en dos mercats es perd en una fira».

José Margenat Sampera

Habiendo observado en algunas plantaciones de avellanos, yemas secas, así como posteriormente brotes secos, desearía me indicasen si puede ser la enfermedad llamada «Borró sec» y la forma de combatirla.

José Margenat  
Sta. Eulalia de Ronsana

Ciertamente la descripción que nos hace corresponde a los síntomas del «Borró sec». Por otra parte personalmente hemos observado, no hace muchos días, ataques de bastante consideración en fincas de Caldas de Montbuy y Sentmenat, lo cual nos refuerza la idea que, efectivamente, se trata de «Borró sec».

### TRATAMIENTOS

En las zonas o fincas afectadas, aconsejamos un primer tratamiento a últimos de

JULIO primeros de AGOSTO y otro en el mes de DICIEMBRE, con una de las siguientes mezclas:

#### Fórmulas:

- Sulfato de Cobre ... .. 2 Kgs.
- Cal viva (recién apagada. Hasta neutralizar) ... .. 1 Kgs.
- Arseniato de Plomo-31 ... 700 grs.
- Agua ... .. 100 litros

- Preparado comercial a base de Sulfato de Cobre (Crotene, etc.) ... .. 800 gr.-1 Kg.
- Arseniato de Plomo-31 . 700 grs.
- Mojante (dosis según casa comercial)
- Agua ... .. 100 litros

La pulverización se hará mojando bien todo el árbol, especialmente las partes más soleadas. De la perfección con que se realice el tratamiento y en parte de la preparación cuidadosa de los caldos, depende el que se obtengan los mejores resultados.

## SERVEI METEOROLÒGIC

### PLUJA

Aigua caiguda a Santa Eulàlia durant el mes de maig:

Dies	litres m. <sup>2</sup>
7 ... ..	31'5
8 ... ..	4
9 ... ..	23'5
11 ... ..	3'4
16 ... ..	8'9

Total ... 71'3

### TEMPERATURES DEL MES

Dies	Màxima	Mínima
1 ... ..	20	9
2 ... ..	20	7
3 ... ..	20	9
4 ... ..	21	9
5 ... ..	19	10
6 ... ..	21	10
7 ... ..	13	7
8 ... ..	16	4
9 ... ..	14	8
10 ... ..	19	6
11 ... ..	18	8
12 ... ..	24	10
13 ... ..	24	12
14 ... ..	23	11
15 ... ..	24	12
16 ... ..	20	9
17 ... ..	23	8
18 ... ..	22	12
19 ... ..	22	12
20 ... ..	24	11
21 ... ..	22	11
22 ... ..	20	11
23 ... ..	24	11
24 ... ..	25	12
25 ... ..	24	12
26 ... ..	26	14
27 ... ..	27	16
28 ... ..	26	15
29 ... ..	27	16
30 ... ..	24	15
31 ... ..	25	16

J. Batlle

### MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Recordamos que, dada la toxicidad del Arseniato, deben transcurrir por lo menos 30 días, desde su aplicación hasta la recolección de la avellana.

No debemos olvidar que la lucha mecánica, consistente en la poda o limpieza de las partes secas del árbol y posterior quemado, abonado racional, riegos normales, la lucha contra la clorosis, etc., y en general todas las medidas que tienden a vigorizar el avellano, son de gran ayuda en la lucha contra esta enfermedad.

## Panadería Bollería SAN ANTONIO

de Jaime Reig

Teléfono 55 El Rieral SANTA EULALIA DE RONSANA

Jaime Reig Nuri  
Jefe de la Agencia Comarcal de Extensión Agraria de Granollers



sa.  
R