

HIGIENE, MEDICINA Y ECONOMÍA DEL CAMP

XV

Medicina de las personas

IV

Socorro á totas las asfixias.—Respiració artificial.—Precaucions dels salvadors.—Socorro á un acabat de neixe.—Conversa important entre dos pagesos.—Fruyts de benedicció.—Lo que falta als pagesos.

Ademés de la asfixia d' un penjat y d' un ofegat que explicarem, hi ha asfixias produïdes per l' àcit carbónich; per l' ayre viciat; per l' ayre confinat; per la calor; pe'l fret; pe'l gas de clavegueras; pe'l gas del alumbrat; pe'l gas d' un braser y del carbó de pedra; pe'l gas d' un cup en fermentació, sia de ví, sia de cervesa ó de sidra; pe'l gas dels pous morts, de las comunas ó bassa; gas de minas, de orinadors; per un llamp; per pressió; per l' óxid de carbono; pe'l cloro y altres gasos irrespirables, y també havém de saber socorre á una criatura quan naix ab senyals d' asfixia, á falta de metje.

Siga la que siga, la causa de l' asfixia, lo primer que s' ha de procurar es restablir la respiració, posant l' asfixiat á un lloch de bon ayre ó sia airejat ab ayre pur y temperat: á esser possible se treu ó talla la roba, y se posa en un llit ó matelás sobre una taula ab un coixí á la part superior del cos porque quedí un xich alt, y 'l cap un poch baix ó penjant, y se 'l tapa ab una flassada ó ab palla, en cas necessari.

Desseguida se li obra la boca introduintli entre las dents un tros de fusta, un bastonet ó un mánech de cullera, y se mantenen separadas las barras, posant un tap de suro entre 'ls caixals.

Ab un drap s' agarra la llengua y ab el dit ó ab una ploma de gallina se renta nas, boca y gargamella de brumera y mucositats, mentres altres persones restableixen el calor y circulació ab fregas secas y rajolas calentas; las fregas millors se poden fer ab un drap rústich untat ab esperit, ayqua de colonia ó vinagre. Al nas aproximarhi un misto encés, y millor el tap d' un frasco de amoniach ó vinagre fort, per produhir una irritació, pero ab prudència, si bé repetintho.

Si l' asfixiat no dóna cap manifestació de vida ab la contracció dels músculs de la cara, ab el pols, dilatació del pit xuglant aire, ni ab la bona senyal de un bâdall, s' ha de recorrer á la respiració artificial, que s' pot fer de las maneras indicades en el capítol anterior.

També se pot fer bufant fort á la boca, tapant el nas del asfixiat, mentres altra persona apreta alternativament sobre panxa y pit imitant els moviments d' inspiració y expiració.