

Tant en l' un com en l' altre resum, el trébol roig ocupa el primer lloch per la utilitat que ha reportat, seguint després l' aufals y blat.

A continuació s' insertan uns quadros ab els datos relatius á cada un dels cultius que s' experimentaren, y de quins quadros, per donar idea dels resultats obtinguts en dits esplets, soisament en copiarém el tant per 100 net que productaren, seguint las prácticas d' aquella Granja:

El blat se produhí á 13'56 pessetas l' hectòlitre y s' obtingué el 29'59 per 100.

L' ordi se produhí á 12'42 pessetas l' hectòlitre y s' experimentá un 9'70 per 100 de pérdua.

El blat de moro se produhí á 13'05 pessetas hectòlitre, y s' experimentá un 4'70 per 100 de pérdua.

La remolatxa forratjera s' obtingué 18'11 pessetas la tonelada y 'l capital produhí el 8'14 per 100 d' interés.

L' aufals se produhí á 4'49 pessetas els 100 kilograms, y 'l capital esmersat doná un rédit del 69'78 per 100.

El trébol roig se produhí á 2'85 pessetas els 100 kilograms y 'l capital doná el 135'42 per 100 de rédit.

Pe'ls anteriors extractes veyém que de las sis plantas cultivadas durant més de cinch anys (els tants per 100 donats sou el promitj de 'ls anys seguits de cultiu en algunas plantas y 10 en altres), quatre donaren benefici y las duas restants se saldaren ab pérdua.

En virtut dels resultats obtinguts en las expressadas experiencias, la Granja de Saragossa establí una rotació ó alternativa d' esplets, que prescindint dels que donaren pérdua, se pogués alcansar un interés major que l' obtingut en las provas indicadas.

A pesar d' haverse saldat en pérdua las cullitas de remolatxa sucrera, cregué la Granja convenient no prescindir d' ella, per rahó de que ab las *pulpas* (residuo de l' industria del sucre) que s' adquireixen per aliment del bestiar á molt bon preu, fa que dit esplet sigui més remunerador que la remolatxa forratjera.

L' aufals, com á planta especial per son cultiu, no pot entrar en nna rotació anyal, y per consegüent també s' ha de prescindir de dit cultiu per formar una alternativa.

Tinguent en compte que 'l trébol roig no pot esser cultivat en un mateix terreny sino ab intervals majors de dos anys, s' adoptá en definitiva, en aquella Granja, la següent alternativa:

Remolatxa sucrera; blat-trebol; trebol; blat; blat de moro; blat-trebol; trebol; blat.

Per els datos exposats, se pot comprendre lo molt interessant qu' es per l' agricultor l' estudi d' una bona alternació de plantas, puig que sapiguentse que no todas las plantas extreuhen del terreno las mateixas cantitats d' elements fertilitants, es fácil comprendre l' importancia d' un estudi d' aytal naturalesa.

Las demostracions de la Granja de Saragossa son forsa instructivas pe'ls agricultors d' aquell país, que encare creuhen que no 's poden obtindre bonas cullitas no més que mitjantsant el *barbecho*, aixó es, fent reposar tots els anys la mitat de la terra, y reduhint, per consegüent, á la mitat las cullitas generals del país.

F. R.