

Tots els nostres lectors coneixen l'importància adquirida per las mesclas cúpricas pel tractament del mildiu y blach-rot, qual tractament entra avuy dia en el cultiu ordinari de la vinya, y per lo tant, convé practicarlo ab el degut coneixement y metodo, á fi d'emplear las dosis necessaries y aplicarlo en las épocas oportunas.

Succeeix en algunas personas que guiadas pel term desitj d'assegurar l'eficacia de l'ensulfatada, usen de dosis de sulfat mes crescudas de las que son necessaries y que, com se comprén, gastan sulfat inutilment. La mescla coneguda pel caldo Bordales que's la fórmula mes usada, deu compondres de las proporcions següents:

Sulfat de coure. .	1 k.	1'500 k.	2 k.
Cals viva. . .	0'500 k.	0'750 k.	1 k.
Ayguà. . . .	100 L.	100 L.	100 L.

ó sigui 1 k. de sulfat en la primera ensulfatada, que convé donarla quant els brots tenen uns deu centímetres; 1'500 k. en la segona, que acostuma á ferse al florir el cep, y 2 k. per la tercera operació ó sigui per la primera quincena d'Agost, si es que las circumstancias no obligan á practicarho en els últims de Juliol. Agricultors hi ha, que fins no excedeixen de 1 k. 500 g. la dosis de sulfat per donar la última ensulfatada.

La mescla mes recomenable ó sigui la coneguda per caldo Bordales. se prepara del modo que segueix:

En una portadora ó disposit que contingui 50 litres d'aygua, s'hi posará á disoldre el sulfat de coure, que á fi de facilitar sa dissolució, es ficarà dintre d'un cistell procurant que aquet estigui en suspens dintre del ayga. En quant á la cals viva, se la